

FATROXIMIN PESARIOS

Pesarios Efervescentes



USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN:

Un pesario contiene: Principio activo: rifaximina 300 mg – Excipientes c.s.p. 4 gr.

Características del principio activo:

FATROXIMIN PESARIOS efervescentes es un preparado a base de rifaximina, antibiótico perteneciente a la familia de las ansamicinas. La particularidad de su estructura química le confiere a la molécula, características físico-químicas que en el estudio de la farmacocinética se ha visto que no existe pasaje del mismo a través de la pared uterina, permitiendo de esta manera una gran disponibilidad de rifaximina a nivel uterino, siendo completamente nulos los residuos en carne y leche.

El mecanismo de acción de la misma es por interacción con el ARN polimerasa ADN dependiente, bloqueando en consecuencia la síntesis proteica bacteriana.

El espectro de acción de la rifaximina comprende bacterias Gram positivas, incluso las anaeróbicas (*Streptococos*, *Stafilococos*, *Actinomicetos*, *Clostridios*, *Bacteroides*, *Fusobacterias*) y algunos Gram negativos.

Características del vehículo:

La efervescencia del pesario provoca una rápida, uniforme y completa difusión de la rifaximina por todo el endometrio. FATROXIMIN PESARIOS es bien tolerado y no ha mostrado ninguna reacción de orden tóxico-reactivo en animales enfermos así como en sanos.

INDICACIONES:

FATROXIMIN PESARIOS efervescentes está indicado para la terapia y prevención de las infecciones bacterianas de los órganos genitales femeninos: metritis, endometritis, cervicitis, vulvovaginitis, infecciones al parto, retención de placenta, profilaxis postquirúrgica u obstétrica.

ESPECIES DESTINADAS Y POSOLOGÍA:

Equinos, bovinos, ovinos y suínos, por vía intravaginal según la siguiente posología:

- Bovinos y equinos:

_ metritis, endometritis, cervicitis: 4 pesarios en una única vez o 2 + 2 pesarios con diferencia de 24 horas.

_ vulvovaginitis: 1+1 pesarios con diferencia de 24 horas

_ intervención quirúrgica u obstétrica: 2 pesarios en una única administración.

- Ovinos y suínos:

_ mitad de la dosis de bovinos y equinos.

En caso de retención de placenta, si dentro de las 24 horas post tratamiento no se verifica un completo desprendimiento, se recomienda introducir 2 pesarios más.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

No administrar en animales con hipersensibilidad a la rifaximina.

REACCIONES ADVERSAS:

Ninguna. De verificar reacciones adversas graves o reacciones no descritas en este folleto ilustrativo, informar a su médico veterinario.

TIEMPO DE ESPERA:

Carne y leche: **0 horas.**

CONSERVACIÓN:

Conservar al resguardo de la luz y a temperaturas entre 5 y 25°C.

Período de validez: 5 años a partir de la fecha de elaboración en el envase íntegro y correctamente conservado.

Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de confeccionamiento: el producto inutilizado y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones legales nacionales. Eliminar/depositar en el centro de acopio más cercano. No dispersar en el medio ambiente.

Fatro Fedagro no se responsabiliza por el mal uso del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS VENTA BAJO RECETA VETERINARIA

PRESENTACIÓN:

Cajas con 2 y 6 blíster con 6 pesarios cada uno.

Registro MGAP A-722

Importa y distribuye Fatro Fedagro S.R.L. Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601 (Km 20). Tel.: 22202336 – Montevideo - Uruguay

Fabrica FATRO S.p.A. – Bologna - Italia.

www.fatrofedagro.com.uy