

Galactis

Lincomicina 750 mg



Gel intramamario para bovinos en lactación

USO VETERINARIO

La Lincomicina es un antibiótico perteneciente, al igual que la Clindamicina y Pirlimicina, a la familia de las lincosamidas. El espectro de acción comprende principalmente a microorganismos Gram positivos, en particular estafilococos y estreptococos como *Staphylococcus aureus* comprendidas las cepas productoras de penicilinasas, estafilococos coagulasa negativos (como *Staphylococcus chromogenes* y *Staphylococcus epidermidis*) *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*. La Lincomicina es activa también frente a bacterias anaeróbicas y micoplasmas. La Lincomicina se liga a la subunidad ribosomal 50S de la bacteria, inhibiendo de esa manera la síntesis proteica de la célula. Se considera un antibiótico bacteriostático tiempo-dependiente.

La MIC frente a estafilococos y estreptococos aislados de mastitis bovinas está comprendida entre 0.25 y 2 µg/ml. En seguida de la administración intramamaria, la concentración media de Lincomicina en leche 12,24,36 y 48 horas después del último tratamiento son respectivamente de 94.6±25.4 µg/ml, 8.5±3.8 µg/ml, 1.3±0.6 µg/ml y 0.5±0.3 µg/ml.

La absorción de Lincomicina por parte del tejido mamario es despreciable.

COMPOSICIÓN:

Un pomo intramamario de 5 gr contiene: *Principio activo*: Lincomicina 750 mg (Como Lincomicina clorhidrato 850 mg) – Excipientes: c.s.p.

INDICACIONES:

Terapia de las mastitis clínicas provocadas por microorganismos Gram positivos sensibles a la Lincomicina, en particular estafilococos y estreptococos en particular como *Staphylococcus aureus* incluidas cepas productoras de penicilinasas, estafilococos coagulasa negativos (como *Staphylococcus chromogenes* y *Staphylococcus epidermidis*) *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* y *Streptococcus uberis*.

ESPECIES DESTINADAS, POSOLOGÍA Y FORMA DE USO:

Bovinas en lactación.

1 pomo intramamario por cuarto a tratar. Repetir el tratamiento cada 12 horas hasta un máximo de 3 veces consecutivas.

Galactis gel intramamario se presenta como pomos intramamarios con sistema "Twinsert". El sistema "Twinsert" permite la inserción parcial o completa de la cánula del pomo intramamario en el canal del pezón según la situación clínica.

El tratamiento antimastitis permite una inserción parcial de la cánula en el canal del pezón permitiendo así reducir notablemente la aparición de nuevas infecciones mamarias.


De hecho la inserción completa de la cánula dilata el esfínter del pezón facilitando el ingreso de bacterias y, al mismo tiempo, puede transportar las bacterias presentes en el estrato de queratina que recubren el conducto del pezón, directamente en la cisterna del mismo. En la inserción parcial, la cánula entra pocos milímetros en el canal del pezón, evitando la dilatación del esfínter, la destrucción del estrato de queratina y además deposita el antibiótico también a lo largo del canal del pezón.

En bovinos muy nerviosos, cuando tienen lesiones en el pezón o en otras situaciones particulares, se recomienda la inserción completa de la cánula.

Antes de comenzar el tratamiento se recomienda ordeñar a fondo cada cuarto mamario a tratar y limpiar los pezones (en particular el orificio) con las toallas desechables especiales incluidos en el paquete. Retire la protección de la cánula de la jeringa intramamaria para la inserción parcial, mientras que, para la inserción completa, es necesario retirar también el "adaptador de inserción parcial". Introducir la cánula en el conducto del pezón e inyectar todo el contenido de la jeringa intramamaria. Retirar la cánula, agarrar el extremo de la tetina con los dedos de una mano y, con el pulgar y el dedo índice de la otra mano, delicadamente empujar el producto contenido en el conducto del pezón hacia arriba. Luego masajear el cuarto delicadamente con


ambas manos, siempre empujando hacia arriba para extender el producto uniformemente en la cisterna de la glándula

INSERCIÓN PARCIAL




Retire la tapa de protección


INSERCIÓN COMPLETA




Administrar




Sacar la tapa de protección



Eliminar el cilindro "parcializador"



Sacar el cilindro "parcializador"



Administrar

TIEMPO DE ESPERA:

Carne y vísceras: 3 días.

Leche: 84 horas (7 ordeñes)

CONSERVACIÓN:

Conservar fuera del alcance de la luz entre 5 y 25°C

Período de validez luego de su fabricación 3 años No usar luego de la fecha de caducidad.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en animales con hipersensibilidad a la Lincomicina o cualquiera de los excipientes.

REACCIONES ADVERSAS:

No existe ninguna descrita. De manifestarse reacciones adversas graves u otras reacciones no mencionadas en este folleto ilustrativo, por favor informe a su médico veterinario.

ADVERTENCIAS ESPECIALES:

El uso del producto debe basarse en las pruebas de susceptibilidad de las bacterias aisladas del animal. Si esto no es posible, la terapia debe basarse en información epidemiológica local (regional o desde el establecimiento de cría). El uso del producto que no sea implementado con las instrucciones dadas puede aumentar la incidencia de bacterias resistentes y pueden disminuir la eficacia de los tratamientos con otros agentes antibacterianos, debido a la posible aparición de resistencia cruzada. El operario con hipersensibilidad al principio activo o sus excipientes debe evitar el contacto con los mismos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón y en caso de contacto accidental con los ojos y las mucosas enjuagar inmediatamente con agua.

Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de confección: el producto inutilizado o vencido y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones legales. Llevar al centro de acopio más cercano. No dispersar en el medio ambiente.

Fatro Fedagro no se responsabiliza por el mal uso del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

VENTA BAJO RECTEA VETERINARIA

PRESENTACIÓN: caja con 20 pomos intramamarios "Twinsert" de 5 gr

Registro MGAP 2017A00390

Director Técnico Dr. Rodolfo Meerhoff

Importa y distribuye FATRO FEDAGRO SRL - Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601 (Km 20).

Tel.: 22202336 – Montevideo - Uruguay

Fabrica FATRO S.p.A. – Bologna – Italia.

www.fatrofedagro.com.uy